

Partner EC

- › FUNGICIDA TRANSLAMINARE E DI COPERTURA AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE
- › ATTIVITÀ PREVENTIVA, CURATIVA ED ERADICANTE
- › MISCELABILE CON PLAYER SC PER AMPLIARE E COMPLETARE LO SPETTRO D'AZIONE

COMPOSIZIONE
procloraz 42,5%
(450 g/l)

FORMULAZIONE
concentrato emulsionabile (EC)

INDICAZIONI DI PERICOLO
CLP: H226; H304; H318; H332;
H335; H373; H410; EUH401

REG. MIN. SALUTE
n° 14472 del 20.11.2008

CODICE FRAC
3

BUFFER ZONE
Non previste



Pericolo

SETTORI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	NOTE	PHI	MAX
Frumento, Triticale	Cercosporiella, Septoriosi	1 l/ha si consiglia miscela con Player SC o Pindarus 25 WDG	Intervenire tra inizio levata e il primo nodo almeno di 1 cm sopra il nodo d'accestimento	35 gg	2 applicazioni ad intervallo di 14 gg
	Septoriosi della spiga		Intervenire tra lo stadio di foglia a bandiera (foglia a bandiera completamente srotolata, ligula visibile) e fine spigatura. Se la malattia appare nelle foglie superiori e in caso di condizioni favorevoli allo sviluppo, intervenire prima possibile dopo lo stadio di foglia a bandiera. Se necessario ripetere il trattamento		
	Oidio		Intervenire prima della fine della spigatura. In caso di forte pressione della malattia o in previsione di forti attacchi intervenire con un antioidico specifico		
	Fusariosi		Intervenire tra inizio e fine spigatura		
Orzo	Elmintosporiosi, Rincosporiosi		Intervenire al primo apparire della malattia, tra fine accestimento e inizio levata (primo nodo almeno 1 cm sopra il nodo di accestimento). Se la malattia si manifesta successivamente (presenza della malattia sulle tre foglie superiori) tra le fasi di foglia a bandiera appena visibile e fine spigatura, intervenire immediatamente	50 gg	1
	Oidio		Intervenire al primo apparire della malattia, o quando si manifestano le condizioni favorevoli al suo sviluppo, tra fine accestimento e fine spigatura		
Segale	Elmintosporiosi, Rincosporiosi, Oidio		Intervenire al primo apparire della malattia, o quando si manifestano le condizioni favorevoli al suo sviluppo, tra fine accestimento e fine spigatura	35 gg	2 applicazioni ad intervallo di 14 gg

I residui delle colture trattate non possono essere destinate a foraggio



AVVERTENZE

In caso di miscela con formulati in granuli idrodispersibili disperdere prima i granuli e successivamente aggiungere Partner EC. Colture di cereali sotto stress dovuto a siccità o ad eccessive piogge devono essere trattate con il prodotto da solo.

Partner EC

FLACONE
1 litro (cartone 12 pz)

