

Simun 40 OD



- › ERBICIDA DI POST-EMERGENZA SELETTIVO PER IL MAIS, ASSORBITO PREVALENTEMENTE PER VIA FOGLIARE
- › A BASE DI NICOSULFURON IN OLIO DISPERSIBILE (ELEVATA STABILITÀ FORMULATIVA)
- › ATTIVO NEI CONFRONTI DI GRAMINACEE ANNUALI, SORGHETTA (DA SEME E DA RIZOMA) E ALCUNE DICOTILEDONI

COMPOSIZIONE

nicosulfuron 4,18% (40 g/l)

FORMULAZIONE

olio dispersibile (OD)

INDICAZIONI DI PERICOLO

CLP: H410; EUH401

REG. MIN. SALUTE

n° 15493 del 31.07.2012

CODICE HRAC

B

BUFFER ZONE

Consultare l'etichetta



Attenzione

SETTORI DI IMPIEGO

COLTURA	DOSE	FASE D'INTERVENTO	PHI	ATTIVITÀ ERBICIDA
Mais		Post-emergenza della coltura e delle infestanti: - mais da 2-3 fino a 5-6 foglie - infestanti dicotiledoni 2-4 foglie - infestanti graminacee da 2 foglie ad inizio accestimento (Sorghetta da rizoma: 10-20 cm di altezza)	n.r.	Infestanti sensibili Graminacee <i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Setaria</i> spp., <i>Sorghum halepense</i> da seme e rizoma Dicotiledoni <i>Amaranthus</i> spp., <i>Fumaria officinalis</i> , <i>Sonchus oleraceus</i>
	1 l/ha	Sulle infestanti sensibili e nelle prime fasi di sviluppo delle malerbe.		Infestanti mediamente sensibili
	1,5 l/ha	Per il controllo della Sorghetta da rizoma e delle infestanti più sviluppate o mediamente sensibili		Graminacee <i>Panicum</i> spp., <i>Digitaria sanguinalis</i>
	1+0,5 l/ha	In presenza di malerbe a nascita scalare frazionare la distribuzione del prodotto in 2 interventi distanziati di 7-10 gg Si consiglia la miscela con Joker e Maisot/Sulcocap in caso di infestazioni complesse		Dicotiledoni <i>Matricaria chamomilla</i> , <i>Mercurialis annua</i> , <i>Polygonum persicaria</i> , <i>Polygonum lapathifolium</i> , <i>Stellaria media</i> , <i>Datura stramonium</i> , <i>Solanum nigrum</i>

Prodotto originale Ascenza



AVVERTENZE

Intervenire con Mais in buono stato vegetativo ed infestanti in fase di attiva crescita evitando di operare con temperatura inferiore a 10°C o superiore a 25°C ed in caso di stress idrici. Si consiglia di alternare prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

Simun 40 OD

FLACONE
1 litro (cartone 12 pz)

TANICA
5 litri (cartone 4 pz)

