

# Sulcocap

- › ERBICIDA SELETTIVO DI PRE E POST-EMERGENZA PER IL MAIS
- › ATTIVO VERSO LE PRINCIPALI INFESTANTI DICOTILEDONI ED ALCUNE IMPORTANTI GRAMINACEE
- › AZIONE FOGLIARE E COMPLEMENTARE ASSORBIMENTO RADICALE

## COMPOSIZIONE

sulcotrione 26,55% (300 g/l)

## CODICE HRAC

F2

## FORMULAZIONE

sospensione concentrata (SC)

## BUFFER ZONE

Non previste

## INDICAZIONI DI PERICOLO

CLP: H361d; H373; H410; EUH208; EUH401



Attenzione

## REG. MIN. SALUTE

n° 14759 del 23.11.2010

## SETTORI DI IMPIEGO

COLTURA	DOSE	FASE D'INTERVENTO	PHI	ATTIVITÀ ERBICIDA
Mais	1-1,5 l/ha	<p>Pre-emergenza in miscela con altri diserbanti selettivi per il mais (es. CLIVIS DUO)</p> <p>Post-emergenza infestanti (dicotiledoni: 2-4 foglie vere; graminacee: 2-3 foglie) con Mais da 2 a 8 foglie</p> <p>La dose maggiore è indicata per il controllo di malerbe più sviluppate (dicotiledoni oltre la 4ª foglia) o in presenza di graminacee (2-4 foglie). In caso di infestazioni complesse si consiglia di miscelare con Joker e Simun 40 OD</p>	n.r.	<p><b>Pre-emergenza</b></p> <p><b>Infestanti sensibili</b>  <i>Abutilon theophrasti</i>, <i>Polygonum aviculare</i>, <i>Polygonum lapathifolium</i>, <i>Polygonum persicaria</i>, <i>Xanthium</i> spp.</p> <p><b>Post-emergenza</b></p> <p><b>Infestanti sensibili</b>  <i>Abutilon theophrasti</i>, <i>Bidens tripartita</i>, <i>Capsella bursa-pastoris</i>, <i>Chenopodium album</i>, <i>Datura stramonium</i>, <i>Fumaria officinalis</i>, <i>Gallinsoga parviflora</i>, <i>Heliantus annuus</i>, <i>Matricaria chamomilla</i>, <i>Polygonum aviculare</i>, <i>Polygonum lapathifolium</i>, <i>Polygonum persicaria</i>, <i>Raphanus raphanistrum</i>, <i>Sinapis arvensis</i>, <i>Solanum nigrum</i>, <i>Sonchus oleraceus</i>, <i>Veronica</i> spp., <i>Xanthium</i> spp.</p> <p><b>Infestanti sensibili ai primi stadi di sviluppo</b>  <i>Amaranthus</i> spp., <i>Digitaria sanguinalis</i>, <i>Echinochloa crus-galli</i>, <i>Panicum</i> spp.</p>

Prodotto originale Nufarm

FLACONE  
1 litro (cartone 12 pz)

TANICA  
5 litri (cartone 4 pz)



## AVVERTENZE

Non applicare su linee pure utilizzate per la produzione di mais da seme. Nel caso di applicazioni in pre-emergenza è necessario che una pioggia di almeno 10-15 mm cada entro 2 settimane dal trattamento. In caso contrario sarà necessario provvedere ad una equivalente irrigazione.