


- METEOR -

SI ABBATTE SUGLI INSETTI DANNOSI



INSETTICIDA PIRETROIDE AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE
FORMULAZIONE FLOWABLE CON ELEVATA MICRONIZZAZIONE
BREVE INTERVALLO DI SICUREZZA SU NUMEROSE COLTURE
PERFETTA SELETTIVITÀ SULLE COLTURE TRATTATE



WWW.DIACHEMITALIA.IT

Chimiberg® - Marchio di Diachem S.p.A.

LAMELA
NON SI
TOCCA

Guarda il film su
www.lamelanonstitocca.it

chimiberg®

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	PHI	N° MAX
Agrumi	Afidi, Aleurodidi, Cocciniglie, Mosca degli agrumi	70-87 ml/hl	30 gg	1
Vite	Tignole, Nottue, Cicaline, Afidi, Sigaraio, Piralide, <i>Popillia japonica</i>	70-90 ml/hl	3 gg	3
Olivo (da olio e da mensa)	Cocciniglie, Tignola, Tripide, Mosca delle olive	80-90 ml/hl	7 gg O. da olio; 3 gg O. da mensa	3 O. da olio
Ortaggi in pieno campo e serra: Cetriolo, Melanzana, Pomodoro, Zucchini, Zucca	Afidi, Aleurodidi, Casside, Cimici, Criocera, Depressaria, Mosca, Piralide, Cavallette	80-90 ml/hl	7 gg Aglio, Cipolla, Porro, Foglie di Sedano, Patata, Cavoli di Bruxelles, Carota; 3 gg altre colture	2 Asparago, Cavolletti di Bruxelles; 3 altre colture
Ortaggi in pieno campo: Aglio, Asparago (solo in post raccolta), Carciofo, Cavoli a infiorescenza (broccoli e cavolfiori), Cavoli di Bruxelles, Cavoli Cappucci, Carota, Cipolla, Fagiolo, Fagiolino, Fava, Lattughe e Insalate (escluso scarola/indivia a foglia larghe e baby leaf di cicoria, spinacio e bietola da foglia), Melone, Pisello, Porro, Peperone, Rucola, Foglie di Sedano	Altiche, Cavolaia, Dorifora, Nottue, Tentredini, Tripidi	60-70 ml/hl		
Patata				
Fragola (in pieno campo e serra)				
Fruento, Orzo, Mais	Piralide, Diabrotica, Afidi, Cimici, Nottue, Tripidi, <i>Popillia japonica</i>	0,6-0,8 l/ha	30 gg Frumento; 3 gg Orzo, Mais	3
Cotone (solo per uso tessile)	Cicaline, Nottue, Piralide, Tripidi, Lygus	0,6 l/ha	15 gg	3
Erba medica	Nottue, Misurino Cavallette	0,6 l/ha 0,8 l/ha		
Barbabetola da zucchero	Altica, Nottue, Mamestra Cleono, Lisso	0,6 l/ha 0,8 l/ha	30 gg	1
Tabacco	Afidi, Tripidi, Nottue, Epitrix	0,6-0,8 l/ha	3 gg	3
Pioppo (in vivaio)	Tarło vespa, Gemmaiola Localizzati al tronco contro Criptorinco e <i>Megaplatypus mutatus</i>	90 ml/hl 150 ml/hl	n.r.	
Pioppo (in pieno campo)	Crisomelidi defogliatori Localizzati al tronco contro Criptorinco e <i>Megaplatypus mutatus</i>	60-90 ml/hl 150-200 ml/hl		
Floreali (in campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Tortricidi, Cetonie, Maggiolino	80-90 ml/hl		
Vivai ed ornamentali (in campo e serra)	Afidi, Cimice del platano, Larve di lepidotteri, Maggiolino, Cetonie, Tingide	80-90 ml/hl		
Melo, Pero, Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio	Psilla, Cocciniglia di San José (neanidi generazione estive), Cidia, Anarsia	90 ml/hl	7 gg Ciliegio, Susino; 3 gg altre colture	
	Microlepidotteri minatori del melo e del pero, Capua, Cacoecia, Antonomo, Maggiolino, Tentredini	60-90 ml/hl		
	Afide verde del melo, Afide del pesco, Tripidi, Mosca della frutta	70-90 ml/hl		
	Carpocapsa	60 ml/hl		
	<i>Aromia bungii</i> di Albicocco, Pesco, Ciliegio, Susino	60-90 ml/hl (trattamenti fogliari) 200 ml/hl (localizzati al tronco)		
	<i>Drosophila suzukii</i> , <i>Bactrocera dorsalis</i> , <i>Halyomorpha halys</i>	80 ml/hl		
Mandorlo	Afidi, Cidia, Antonomo	70-87 ml/hl	30 gg	


MODALITÀ D'AZIONE: insetticida attivo prevalentemente per contatto, a dosi molto basse di sostanza attiva, con rapido effetto abbattente

CODICE IRAC: 3A – applicare idonee strategie antiresistenza



CONSIGLI PER IL CORRETTO IMPIEGO

- Bagnare accuratamente la vegetazione trattata intervenendo precocemente su insetti esposti, non protetti da tessuti vegetali (per es. foglie arrotolate). In caso di colture di difficile bagnatura aggiungere idoneo coadiuvante (per es. Vector a 50 ml/hl)
- Le dosi si riferiscono a trattamenti a volume normale: per interventi a volume ridotto aumentare proporzionalmente la dose per distribuire la stessa quantità di prodotto a ettaro
- Per la protezione dei corpi idrici superficiali leggere attentamente le istruzioni riportate in etichetta

COMPOSIZIONE	Deltametrina 1,51% (15,7 g/l)
REG. MIN. SALUTE	n° 10976 del 12.07.2001
INDICAZIONI DI PERICOLO	Attenzione  H410; EUH208; EUH401
FORMULAZIONE	Sospensione concentrata (SC)
CONFEZIONI	Flacone 250 ml (cartone 20 pz); flacone da 1 l (cartone 10 pz); tanica da 5 l (cartone 4 pz), tanica da 10 l

CHIMIBERG marchio di **DIACHEM** S.p.A.

Uffici e stabilimento:

Via Mozzanica, 9/11 - 24043 CARAVAGGIO (BG) - Tel. 0363 355611
info@diachemitalia.it www.diachemitalia.it

Azienda con Sistema di Gestione Certificato:

QUALITÀ ISO 9001, SICUREZZA ISO 45001, AMBIENTE ISO 14001

Organismo di Certificazione: SGS ITALIA S.p.A.

